



nazwa: **Brit Veterinary Diet Dog Diabetes Turkey & Pea 2kg**

marka: **Brit**

towar obecnie niedostępny

Diabetes dla psów Kompletna i zbilansowana karma dietetyczna wspomagająca leczenie cukrzycy.

Wskazania: Cukrzyca Przewlekłe zapalenie jelita grubego Przeciwwskazania: Szczenięta Ciężarne i karmiące suki Zalety produktu Wysoka zawartość łatwo przyswajalnego i dietetycznego białka Łatwo przyswajalne białka dla utrzymania masy mięśniowej i kondycji. Nisko energetyczne źródło glukozy dla metabolizmu komórkowego. □ Receptura bez zbóż i niskotłuszczowa Niski indeks glikemiczny, obniża ryzyko hiperglikemii poposiłkowej □ Zbilansowana ilość rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika

Stabilizacja i kontrola glikemii poposiłkowej. Ułatwia utratę wagi i zdrowe trawienie. □ L-karnityna Optymalizacja metabolizmu glukozy, metabolizmu tłuszczu oraz ochrona białek mięśniowych □ Chondoprotektory Wspomaganie regeneracji chrząstki stawowej oraz poprawa mobilności psów z nadwagą lub otyłością. □ Kwasy tłuszczowe omega-3 i przeciwutleniacze (witamina E i C, selen) Chronią komórki przed zwiększoną reakcją zapalną i stresem oksydacyjnym przy cukrzycy □ Probiotyk enterococcus faecium Przyczynia się do poprawy zdrowia jelit, równowagi flory bakteryjnej jelit i wspomaga układ odpornościowy Skład: dehydratyzowany indyk (30%), żółty groszek (18%), hydrolizowane białko indyka (14%), suszone jabłka, białko żółtego grochu, lignoceluloza bambusowa (5%), tłuszcz z kurczaka (3%), olej z łososia (2%), hydrolizat wątroby drobiowej (2%), minerały, łuski i nasiona babki płesznik (0,5%), suszone algi (0,5%, Ascophyllum nodosum), chlorek sodu, hydrolizat muszli skorupiaków (źródło siarczanu glukozaminy, 0,035%), hydrolizowana chrząstka (źródło siarczanu chondroityny, 0,023%), wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów, 0,018%), beta - glukany (0,018%), rokitnik zwyczajny (0,015%), fruktooligosacharydy (0,012%), jukka Mojave (0,012%). Analiza: białko surowe 37,0%, zawartość tłuszczu 12,0%, włókno surowe 6,5%, popiół surowy 7,5%, wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe omega - 3 0,5%, kwasy tłuszczowe omega - 6 1,35%, wapń 1,6%, fosfor 1,2%, sód 0,35%, magnez 0,08%, skrobia 16%, cukry łącznie 1,5%. Dodatki na 1 kg: witamina A (3a672a) 20 000 IU, witamina D 3 (E671) 1000 IU, wita mina E (3a700) 1000 mg, witamina C (3a312) 500 mg, chlorek choline (3a890) 2300 mg, biotyna (3a880) 2,4 mg, witamina B 1 (3a821) 11 mg, witamina B 2 10 mg, niacynoamid (3a315) 55 mg, D - pantotenian wapnia (3a841) 25 mg, witamina B 6 (3a831) 7 mg, kwas foliowy (3a316) 5 mg, witamina B 12 0,17 mg, uwodniony aminokwasowy chelat cynku (3b606) 140 mg, chelat aminokwasowy żelaza, hydrat (E1) 45 mg, aminokwasowy chelat manganowy, hydrat (E5) 60 mg, jodek potasu (3b201) 3,5 mg, chelat miedzi z aminokwasami, hydrat (E4) 5 mg, organiczna postać selenu wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I - 3060 (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem) (3b8.10) 0,2 mg, tauryna (3a370) 2300 mg, L - karnityna (3a910) 500 mg. STABILIZATORY FLORY JELITOWEJ NA 1 KG: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707) 1x10⁹ CFU. Zawiera przeciwutleniacze zatwierdzone w UE: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych (1b306), palmitynian askorbylu (1b304) i wyciąg z rozmarynu. Dawkowanie: POCZĄTKOWY OKRES KARMIENIA: Początkowo podawać Karmę weterynaryjną Brit Cukrzyca dla psów przez okres do 6 miesięcy. Dzienną dawkę karmy należy rozdzielić na 3 równe porcje i podawać w regularnych odstępach czasu w

zależności od kondycji zdrowotnej psa. Regularne pomiary poziomu glukozy we krwi to podstawa ustalenia optymalnej dawki insuliny. Nie podawać psu żadnego innego jedzenia, karmy czy przekąsek. KARMIENIE
DŁUGOOKRESOWE: Utrzymanie optymalnej wagi u psów z cukrzycą poprawia wrażliwość na insulinę.
Regularna kontrola wagi ciała to podstawa skutecznej walki z cukrzycą.

porcja (g)		Waga psa (kg)										Dzienna	
2	35	5	85	10	140	15	190	20	230	25	280		
30	320	40	400	50	460	60	530	70	600	80	660	□	