



nazwa: [Frontline Spot-On XL \(pszy 40-60kg\) 1 pipeta](#)

marka: Frontline

cena: 24.00 zł

Produkt sprzedawany wyłącznie z opcją odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

FRONTLINE SPOT-ON XL Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł, kleszczy, wszołów oraz alergicznego pchlego zapalenia skóry. Frontline Spot-on XL preparat dla psów o wadze 40-60 kg stanowi sprawdzoną, specjalistyczną ochronę dla Twojego zwierzęcia, likwidując oraz zabezpieczając przed takimi pasożytami jak pchły, kleszcze czy wszoły. Dodatkowo skutecznie chroni przed alergicznym zapaleniem skóry wywołanym przez pchły. □ dla psów 40-60 kg skoncentrowany roztwór w formie pipetki do stosowania miejscowego Frontline Spot-on skutecznie usuwa pasożyty oraz długotrwale chroni zwierzę przed atakiem pasożytów.

□ ochrona przed pchłami przez okres do 4 tygodni □ ochrona przed kleszczami przez okres do 2 tygodni □ ochrona przed wszołami przez okres do 2 tygodni SKŁAD PRODUKTU LECZNICZEGO 4,02 ml (1 pipeta) zawiera: substancja aktywna: Fipronil 402 mg POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować w przypadku zwierząt ze stwierdzoną

nadwrażliwością na którykolwiek ze składników zawartych w preparacie Nie stosować u szceniąt, które mają mniej niż miesiące. Nie stosuj preparatu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę zwierzęcia Produktu nie stosować wewnątrz. Wyłącznie do użytku zewnętrznego Nie stosować u królików i kotów. SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość pipetki z roztworem zaaplikować bezpośrednio na skórę kota (po rozchyleniu sierści), w miejsce które zwierzę nie będzie w stanie lizać (np. okolice karku). Po aplikacji nie należy kąpać zwierzęcia w ciągu 48 godzin.

□ Trzymać zwierzę z dala od dzieci Unikać kontaktu roztworu z palcami. Po aplikacji dokładnie umyć ręce Przerwa między kolejnymi dawkami nie powinna być mniejsza niż 4 tygodnie SPECJALNE ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT Chronić oczy zwierzęcia przed kontaktem z preparatem. Jest ważne aby preparat został nałożony w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt poddanych zabiegowi. Z uwagi na brak badań nad wpływem kąpieli/zanurzania w wodzie w pierwszych 2 dniach po zastosowaniu preparatu nie zaleca się kąpieli zwierząt w tym okresie oraz częstszych niż 1 raz w tygodniu. Można stosować szampony zmiękczające przed podaniem preparatu, jednakże skracają one okres ochrony przed reinwazją pcheł do około 5 tygodni, jeśli będą stosowane co tydzień po zabiegu. Jednakże cotygodniowe kąpiele z zastosowaniem szamponu leczniczego zawierającego 2% chlorheksydyne nie miało wpływu na skuteczność preparatu przeciw pchłom w okresie 6 tygodniowej obserwacji. Zaleca się, aby psy nie pływały w zbiornikach i ciekach wodnych przez okres 2 dni po zabiegu. Po zabiegu mogą pozostawać na sierści pojedyncze kleszcze. Dlatego, w niekorzystnych warunkach, nie można całkowicie wykluczyć możliwości transmisji chorób zakaźnych. Pchły atakujące zwierzęta występują także w legowiskach oraz miejscach, w których koty często przebywają, takich jak dywany oraz miękka tapicerka, które – w przypadkach masowej inwazji oraz na początku zabiegów zapobiegawczych – powinny być również poddawane działaniu odpowiednich preparatów owadobójczych i regularnie odkurzane za pomocą odkurzacza. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB PODAJĄCYCH PRODUKTY

LECZNICZE WETERYNARYJNE ZWIERZĘTOM Preparat Frontline Spot-On może wywoływać podrażnienie błon śluzowych i oka. Dlatego należy unikać jego kontaktu z jamą ustną i oczami. Kontakt z

preparatem powinny unikać zwierzęta i osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z palcami. Jeśli do niego dojdzie, należy zmyć ręce wodą z mydłem. W razie przypadkowego przedostania się preparatu do oczu operatora – należy je natychmiast dokładnie przepłukać czystą wodą. Myć ręce po zabiegu. Nie dokonywać żadnych zabiegów na zwierzętach poddanych zabiegowi i nie przemieszczać ich do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu. Dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami poddanymi zabiegowi do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu. Dlatego zaleca się przeprowadzanie zabiegu na zwierzęciu we wczesnych godzinach popołudniowych/wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Nie palić, nie jeść i nie pić w czasie zabiegu. **DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE** Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu, może pojawić się krótkotrwałe ślinienie się wywołane działaniem nośnika. Wśród niezmiernie rzadko notowanych reakcji niepożądanych po zastosowaniu preparatu obserwowano przemijające odczyny skórne w miejscu podania (rumień, świąd, miejscowe wyłysienie) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. W wyjątkowych przypadkach obserwowano po zabiegu nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulicę, depresję, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego. Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon.

□